

# Mycofenolzuur + hypericum

8931

Bron	Pagina	Ref. nr.	Bewijs	Effect (omschrijving + letter)
Hansten jan 2004	980d	1		ref. niet te bestellen, fout in Hansten?
Stockley ed. 8	--			
Extra				
Stockley ed. 8	1070	1 - hypericum		geen wijziging kinetische parameters AUC, Cmax, Cmin of tmax; geen dosisaanpassing nodig na toevoegen hypericum 600 mg/dag gedurende 14 dagen bij 8 patiënten (niertransplantatie) op mycofenolzuur en tacrolimus.

## Opmerkingen

- Hansten ref. 1 (Ther Drug Monit 2003;25:511, niet in het bezit GIC): geen interactie tussen mycofenolaat mofetil en St. Janskruid (*hypericum*). Open label studie, St. Janskruid 600 mg/dag gedurende 14 dagen: AUC mycofenolzuur onveranderd.

→ GIC: waarschijnlijk is dit dezelfde studie als Stockley ref. 1. Eerste auteur van deze studie = derde auteur Stockley ref. 1, toediening hypericum is precies hetzelfde, ook naar zowel mycofenolzuur als tacrolimus gekeken.

Alfanum. code	--			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
Incidentie	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	nee	nee	23 maart 2010