Ulipristal + CYP3A4-remmers 9121

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC Esmya (vleesboom)	ulipristal + erytromycine	*toename AUC* ulipristal 1.2x en *Cmax* 2.9x en *AUC actieve metaboliet* 1.5x; *afname Cmax* actieve metaboliet 0.5x na erytromycine 500 mg 2dd gedurende 9 dagen bij vrouwelijke vrijwilligers Gelijktijdige gebruik met sterke CYP3A4-remmers (bv.ketoconazol, ritonavir, nefazodon) wordt niet aanbevolen.	2A

Overig	Stof	Effect
SPC Ellaone (noodanticonceptie)	ulipristal + CYP3A4-remmers	Ulipristalacetaat wordt hoofdzakelijk gemetaboliseerd door CYP3A4. Er is geen in-vivo-onderzoek naar specifieke geneesmiddelinteracties uitgevoerd. Potente CYP3A4-remmers (zoals ketoconazol, itraconazol, telitromycine, claritromycine en nefazodon) kunnen de blootstelling aan ulipristalacetaat vergroten. De klinische relevantie hiervan is niet bekend. → GIC: contact met fabrikant leverde geen aanvullende informatie op.

Opmerkingen
PubMed: geen gegevens.
Stockley: product informatie
Hansten: interactie niet genoemd.

Alfanum. code	erytromycine: 2A	overige remmers: --		

Risicogroep	

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	2A	Ja	Nee	26 juni 2012