

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Jensen JC. J Dermatol Treat 1990;1, Suppl.2:15-8	terbinafine + rifampicine	Overzichts artikel van de kinetiek van terbinafine, die interactie-informatie aanhaalt onder vermelding dat dit gepubliceerd gaat worden. afname AUC terbinafine van 4128 naar 2011 ng.hr/ml (factor 2) en toename klaring van 1196 naar 2469 ml/min (factor 2) Regime: terbinafine 250 mg na voorbehandeling met rifampicine 600 mg/dag gedurende 6 dagen bij 12 vrijwilligers. Auteurs: "the full results of this study will be presented elsewhere." → GIC: anno 2010 publicatie niet gevonden.	0A

Opmerkingen

Stockley: "Be alert for the need to increase the dosage of terbinafine if rifampicine is given."

SPC Terbinafine Mylan: de plasma-eliminatie van terbinafine kan worden versneld door middelen die het metabolisme induceren, zoals rifampicine.

SPC Rifampicine: gelijktijdig gebruik van rifampicine met o.a. terbinafine vereist het volgen van specifieke parameters of klinische bewaking.

SPC Rifadin: terbinafine niet genoemd.

PubMed, Idis: search op overige 'krachtige' CYP3A4-inductoren (bosentan, carbamazepine, dexamethason, fenobarbital, fenytoïne, primidon, rifabutine) levert 1 casus met carbamazepine, waarbij een effect andersom wordt gezien, zie Carbamazepine + terbinafine.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	22 maart 2011