

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Jensen JC. J Dermatol Treat 1990;1, Suppl.2:15-8	terbinafine + cimetidine	Overzichts artikel van de kinetiek van terbinafine, die interactie-informatie aanhaalt onder vermelding dat dit gepubliceerd gaat worden. toename AUC terbinafine van 4128 naar 5514 (1.3x) ng.hr/ml en afname klaring van 1196 naar 835 ml/min (1.4x) Regime: terbinafine 250 mg na voorbehandeling met cimetidine 400 mg 2dd gedurende 5 dagen bij 12 vrijwilligers Auteurs: "the full results of this study will be presented elsewhere." → GIC: nu 20 jaar later, publicatie niet gevonden.	0A
SPC Terbinafine Mylan geen EPAR gevonden	terbinafine + fluconazol	toename Cmax terbinafine met 50% en AUC met 70% na 1-malig 100 mg fluconazol bij gezonde vrijwilligers	1A

Overig	Stof	Effect
Hall M. Arch Dermatol 1997;133:1213-9	terbinafine + cimetidine	post-marketing surveillance studie met 25884 patiënten op terbinafine 250 mg/dag, waarvan 40% op ten minste 1 ander geneesmiddel waaronder cimetidine. Co-medicatie had geen invloed op de incidentie van bijwerkingen

### Opmerkingen

Stockley: toename AUC terbinafine door cimetidine is bescheiden, en schijnt weinig tot niet klinisch relevant te zijn.

SPC Terbinafine Mylan: plasma-eliminatie van terbinafine kan worden vertraagd door middelen die het cytochroom P450 remmen (zoals cimetidine).

SPC Cimetidine, Diflucan: noemt terbinafine niet.

PubMed/Idis: geen aanvullende gegevens.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	22 maart 2011