

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
Calvisi V. Rev Med Liege. 1999;54:912-3.	fenelzine + tramadol	<i>delirium</i> (angstig, verward, visuele hallucinaties), binnen 3 dagen na stoppen langdurige behandeling fenelzine 45 mg/dag en starten tramadol 100 mg 3dd, i.m. bij vrouw (63). Symptomen verdwijnen < 48 uur na stoppen tramadol. → WFG: niet onderbouwend want acuut staken fenelzine kan onttrekkingsverschijnselen geven. Een delier kan vele oorzaken hebben. Dubieuze dechallenge.
Gold DG. J Pharm Technol 2003;19:19-22.	fenelzine + tramadol	<i>delirium en psychose</i> , 4 dagen na toevoeging tramadol 50 mg 3dd vanwege operatie, bij vrouw (67, depressie en angststoornis) al 20 jaar op fenelzine 150 mg/dag (!). Fenelzine 1 dag later abrupt gestaakt. 4 dagen na staken bloeddruk 142/60, T 37.5 °C, trillingen, agitatie, hallucinaties, wanen, paresthesieën op bovenste en onderste extremiteiten. Daarna geleidelijk herstel. Vanwege delirium en psychose wordt patiënt opgenomen in een kliniek. Daar wordt de fenelzine abrupt gestaakt, dit kan een oorzaak zijn voor het lang aanhouden van het delirium. → GIC: optreden klachten kunnen ook duiden op bijwerking tramadol. → WFG: qua chronologie kan het kloppen maar veel mensen raken delirant na een operatie; de casus zou wel onderbouwend zijn als er geen OK tussen zat.
de Larquier A. Therapie 1999;54:767-8. → GIC: telt niet mee, iproniazide niet in Nederland verkrijgbaar.	iproniazide + tramadol	serotoninesyndroom (myoclonus, tremor, zweten, hyperreflexia en tachycardie) na toevoegen tramadol aan iproniazide bij patiënt (50). Dit gebeurt opnieuw na de 2e gift. Binnen 48 uur na staken tramadol herstelt de patiënt. → GIC: lich. temp niet gegeven

Opmerkingen

WFG 22-03-2011: er is geen bewijs voor interactie, maar signaal is toch gewenst omdat er wel bewijs is voor interactie van tramadol met SSRI's. Men is sinds de jaren 60 heel voorzichtig met voorschrijven van fenelzine en tranylcypromine, dit kan ook een reden zijn voor ontbreken bewijs.

Er is echter wel bewijs voor het optreden van lichte serotonerge toxiciteit bij combinatie van SSRI's met tramadol / oxycodon. In theorie zou deze interactie dan ook moeten plaatsvinden bij fenelzine en tranylcypromine. Gebrek aan bewijs kan ook komen doordat fenelzine en tranylcypromine op veel kleinere schaal worden toegepast dan SSRI's en men uiterst voorzichtig is met combinatie met serotonerge stoffen.

Hansten: 'Usually avoid', gebaseerd op productinformatie.

Stockley: information is limited, maar MAO-remmers en tramadol hebben serotonerge werking. In praktijk bij combinatie monitoren op symptomen serotoninesyndroom.

PubMed 28-2-11: geen aanvullende informatie bij zoeken op fenelzine/tranylcypromine + tramadol.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Nee	Ja	22 maart 2011

Fenelzine/tranylcypromine + oxycodon

B

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

WFG 22-03-2011: er is geen bewijs voor interactie, maar signaal is toch gewenst omdat er wel bewijs is voor interactie van oxycodon met SSRI's. Men is sinds de jaren 60 heel voorzichtig met voorschrijven van fenelzine en tranylcypromine, dit kan ook een reden zijn voor ontbreken bewijs.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	als A		