

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Gillman PK. Med J Aust 1995;162:554.	moclobemide + pethidine	rusteloos, verward, myoclonus, snel na 1e van 3 injecties pethidine 75 mg bij vrouw (73) op moclobemide 750 mg/dag. Geen koorts. Snel herstel na staken pethidine. Co-medicatie: nortriptyline, lithium. Auteur: mogelijk hebben hoge spiegels lithium (1.2 mmol/l) en nortriptyline (500 ug/l) de verwardheid gegeven.	1C

Opmerkingen

Stockley: 'although information is sparse, the manufacturer of moclobemide contraindicates the use of pethidine'. Omdat moclobemide reversibel MAO-remt, is interactie 48 uur na staken moclobemide niet waarschijnlijk.

SPC Aurorix: toediening in combinatie met pethidine wordt niet aanbevolen.

PubMed 25-2-11: geen nieuwe info.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	22 maart 2011

Rasagiline/Selegiline + Pethidine

B

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Zornberg GL. Lancet 1991;337:246.	selegiline + pethidine	rusteloos, agitatie, delier, spierrigiditeit, 38.2°C, 1 dag na start pethidine bij man (56) op selegiline 5 mg 2dd. Pethidine gestaakt op na 3e dosis (op dag 4). Dag later tevens selegiline gestaakt. Co-medicatie: o.a. imipramine 175 mg 4 dd (ook serotonerg). Echter: combinatie selegiline + imipramine probleemloos gebruikt, tijdsrelatie toediening pethidine/optreden symptomen met elkaar in overeenstemming. WFG: ernstcode D, want symptomen (o.a. delier) passen beter bij categorie D dan C.	1D

Overig	Stof	Effect
Starr C. Lancet 1991;337:554.	selegiline + pethidine	commentaar: volgens Zornberg wordt er in de PDR ("Physician's Desk Reference") gesteld dat er geen meldingen zijn van interactions met selegiline. Maar dat is niet correct, de PDR meldt wel dat wel.

Opmerkingen

Hansten: selegiline USUALLY AVOID gebaseerd op productinformatie.

SPC Eldepryl: er zijn interacties beschreven tussen zowel niet-selectieve MAO-remmers en pethidine als ook tussen selegiline en pethidine. Aangezien het mechanisme van deze interactie tot op heden slecht begrepen wordt, lijkt het voorzichtigheidshalve verstandig om gelijktijdig gebruik van Eldepryl (selectieve MAO-B remmer) en pethidine te voorkomen.

SPC Azilect: pethidine gecontraïndiceerd. Ernstige bijwerkingen bij gelijktijdig gebruik van pethidine en MAO-remmers, als ook met een andere selectieve MAO-B remmer (GIC: men doelt waarschijnlijk op selegiline). Bij staken rasagiline minimaal 14 dagen wachten alvorens te starten met pethidine.

→ WFG 20-9-2005: rasagiline toevoegen.

WFG 3-7-07: er zijn opvallend weinig interacties met MAO-remmers, maar wél met pethidine; kennelijk maakt het voor pethidine niet uit of het MAO-A of -B is (itt tramadol), dus selegiline en rasagiline wel gekoppeld houden.

PubMed 28-2-11: geen aanvullende informatie bij zoeken op selegiline/rasagiline + pethidine.

Risicogroep			
	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	als A		