

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
Hernandez AF. J Forensic Sci 1995;40:128-30.	moclobemide + tramadol	man pleegt suïcide; doodsoorzaak mogelijk serotonine-syndroom vanwege inname moclobemide (spiegel 59.76 mg/l), clomipramine (1.69 mg/l) en tramadol (10.89 mg/l).
Anoniem. Australian Adverse Drug Reactions Bulletin 2001;21:14.	moclobemide + tramadol	serotoninesyndroom 1x gemeld op moclobemide + tramadol. → Projectgroep 2002: informatie is te summier om te kunnen beoordelen als interactie.

### Opmerkingen

Stockley (tramadol): 'information is limited'. In praktijk bij combinatie monitoren op symptomen serotoninesyndroom.

Stockley (oxycodon, fentanyl): the advice is somewhat conflicting. If an opioid is given to a patient taking a MAOI, it would seem prudent to choose one that lacks serotonergic activity (e.g. codeine, morphine, oxycodone). Monitor concurrent use carefully for any signs of adverse effects.

SPC Aurorix: tramadol niet genoemd.

SPC Moclobemide Sandoz: moclobemide versterkt het effect van opiaten zoals tramadol; gelijktijdige toediening van tramadol is gecontraïndiceerd.

SPC Tramal: mag niet worden gecombineerd met MAO-remmers.

SPC Theradol: bij patiënten die MAO-remmers krijgen toegediend, of deze de afgelopen 14 dagen hebben gebruikt. Moclobemide niet genoemd.

SPC oxycodon, fentanyl: contra-indicatie, 2 weken interval nodig met MAO-remmers.

PubMed 28-2-2011: geen aanvullende informatie bij zoeken op moclobemide + tramadol, oxycodon, fentanyl.

Alfanum. code	moclobemide: --	oxycodon: --	fentanyl: --	
---------------	-----------------	--------------	--------------	--

Risicogroep	
-------------	--

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	22 maart 2011

# Selegiline/rasagiline + tramadol/ fentanyl/oxycodon

9512b

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

## Opmerkingen

Hansten: 'Usually avoid', gebaseerd op productinformatie.

SPC Selegiline Sandoz: tramadol niet genoemd.

SPC Eldepryl: de mogelijkheid bestaat dat tramadol interactie heeft met geneesmiddelen die de monoaminerge neurotransmissie bevorderen inclusief MAO-remmers. Tramadol dient derhalve niet gelijktijdig met selegiline te worden toegediend.

SPC Azilect: tramadol wordt niet genoemd.

SPC Theradol, Tramal, oxycodon, fentanyl, rubriek contra-indicatie: gelijktijdig of binnen twee weken na, gebruik van MAO-remmers. Selegiline/rasagiline niet genoemd.

PubMed 28-2-11: geen aanvullende informatie bij zoeken op selegiline/rasagiline + tramadol, oxycodon, fentanyl.

Alfanum. code	--			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
-------------	--

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	als 9512a			