

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
Vazquez B. Epilepsia 2001;42:261-2	zonisamide + topiramaat	geen ontwikkeling nierstenen bij 10 patiënten die topiramaat en zonisamide in combinatie gebruikten. Auteurs: remmers van koolzuuranhydrase worden geassocieerd met verhoogd risico op ontwikkelen nierstenen.
Kossoff EH. Epilepsia 2002;43:1168-71	zonisamide + topiramaat	geen verschil in ontwikkeling nierstenen tussen kinderen met alleen ketogeen dieet en kinderen met ketogeen dieet in combinatie met topiramaat of zonisamide.

### Opmerkingen

Stockley: there appears to be a theoretical risk of a pharmacodynamic interaction between zonisamide and topiramate, but the limited evidence that is available suggests the interaction is unlikely to be of importance.

SPC Zonegran: voorzichtigheid bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met koolzuuranhydraseremmers zoals topiramaat, want mogelijk farmacodynamische interactie.

SPC Topamax: geen informatie.

Informatorium: 1-10% gebruikers zonisamide en 1-10% gebruikers topiramaat ontwikkelt nierstenen.

Scientific Discussion, Micromedex, Hansten: geen informatie.

Gezocht in Pubmed op zonisamide + acetazolamide: geen resultaten.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Nee	Nee	10 mei 2011