

# Dextromethorfan + Pazopanib

MFB 1061

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Goh BC. Clin Pharmacol Ther 2010;88:652-9.		toename ratio dextromethorfan/dextrofan in urine: van 0.08 naar 0.11 (1.33x) op 0-4h van 0.1 naar 0.16 (1.64x) op 4-8 h van 0.15 naar 0.22 (1.45x) op 10-24 h Overall toename met 33-64% na toevoegen dextromethorfan (in testcocktail) aan pazopanib 800 mg/dag bij 23 patiënten met kanker.	3A
SPC Votrient  EPAR Votrient p. 28		33-64% toename ratio dextromethorfan ten opzichte van dextrofanconcentratie in urine  p. 28: studie VEG10007: afname metabolisme dextromethorfan met 33-64%. Regime: pazopanib 800 mg/dag, na 16 dagen, 1- malig dextromethorfan 30 mg (in testcocktail) bij patiënten met solide tumoren Results from this study indicate that pazopanib 800 mg once daily was a weak inhibitor of CYP2D6	2A

## Opmerkingen

Dextromethorfan wordt door CYP2D6 omgezet in de actieve metaboliet dextrofan. Pazopanib remt enigszins CYP2D6.

PubMd/Idis: geen aanvullende gegevens.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	Ja	Nee	20 juli 2011