

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC De-Nol		Vanaf een half uur vóór tot een half uur na het innemen van De-Nol dienen geen andere geneesmiddelen, in het bijzonder antacida, melk, vruchten of vruchtensap geconsumeerd te worden, daar deze invloed op de werking kunnen hebben.

Opmerkingen

Bestand november 2011: interactie opnieuw opgevoerd, want weer product (De-Nol) in de handel.

Bestand juni 2008: interactie laten vervallen (was IA 0337), er zijn geen producten meer verkrijgbaar.

Projectgroep 2002: niet uitbreiden met omeprazol.

Het effect zou berusten op adsorptie van bismut aan antacida en NIET op pH-effect. Er zijn geen klinische studies voorhanden die dit onderbouwen. Bismut slaat neer bij lage pH en beschermt ulcera tegen zuur.

Omeprazol, ranitidine: toename maag pH → bismut slaat niet neer → toename absorptie bismut met kans op toxiciteit.

SPC Pylorid: tevens werking van bismut tegen H.Pylori, mits bismut is opgelost.

SPC De-Nol: half uur voor en na inname geen antacida gebruiken.

WFG 4-12-2000: volgens Stockley verhogen omeprazol en ranitidine de AUC van bismut met een factor 4.

Nadere studie is nodig. Volgens de heer Brouwers klopt dit niet, de pH=9 van suspensie DeNol ("soort ammoniak").

Alfanum. code	0-			
---------------	----	--	--	--

Risicogroep	
-------------	--

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	0-	Nee	Nee	23 april 2002