

# Febuxostat + Naproxen

# M1135

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Khosravan R. J Clin Pharmacol 2006;46:855-6.	febuxostat + naproxen	toename Cmax febuxostat van 1.75 naar 2.25 µg/ml (28%), AUC van 6.88 naar 9.69 µg.h/ml (41%) en t½ van 6.2 naar 7.8 uur (26%). Regime: febuxostat 80 mg/dag en naproxen 500 mg 2dd gedurende 7 dagen bij 24 vrijwilligers. Auteurs: toename AUC is klinisch niet relevant; volgens ongepubliceerde data bleek febuxostat 300 mg/dag gedurende 7 dagen veilig bij vrijwilligers (AUC 48.36 µg.h/ml).  Andersom: geen effect van febuxostat op kinetiek naproxen.	3A
SPC Adenuric	febuxostat + naproxen	toename Cmax febuxostat met 28%, AUC met 41% en t½ met 26% na gelijktijdig gebruik met naproxen 250 mg 2dd. Kan gelijktijdig worden gebruikt met naproxen.	2A

Ontkrachtend	Stof	Effect
Khosravan R. J Clin Pharmacol 2006;46:855-6.	febuxostat + indometacine	geen wijziging Cmax, AUC en t½ van febuxostat bij 26 vrijwilligers na febuxostat 80 mg/dag en indometacine 50 mg 2dd gedurende 5 dagen Andersom: geen wijziging kinetiek indometacine door febuxostat

## Opmerkingen

Hansten: met naproxen zijn geen maatregelen nodig. Met indometacine: geen interactie.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	26 juni 2012