

Fampridine + diverse stoffen

10618

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Fampyra	fampridine + cimetidine	gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die OCT2 remmen, bijvoorbeeld cimetidine, is gecontraïndiceerd. Navraag fabrikant Fampyra: er is geen onderzoek uitgevoerd naar combinatie fampridine + OCT2-remmers/substraten.
SPC Fampyra	fampridine + carvedilol, propranolol, metformine	voorzichtig met gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die substraten zijn van OCT2, bijvoorbeeld carvedilol, propranolol en metformine.

Opmerkingen

Stockley, Hansten, Micromedex, Scientific Discussion Fampyra: geen informatie.

Pubmed: fampridine + cimetidine/kinidine/testosteron/cetirizine (OCT2 remmers) levert geen hits op. Fampridine + carvedilol/propranolol/metformine (OCT2 substraten) levert geen hits op.

Alfanum. code	cimetidine: --	carvedilol: --	propranolol: --	metformine: --
---------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Risicogroep	
-------------	--

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	9 oktober 2012