

Acenocoumarol/fenprocoumon + Vismodegib MFB 1245

Protrombinetijd = PT

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Marcoumar, acenocoumarol	acenocoumarol, fenprocoumon + nibben	noemt vismodegib niet
SPC Erivedge	vismodegib	interactie niet genoemd
EPAR Erivedge versie 30-07-2013	vismodegib	vismodegib inhibited CYP2C8 and 2C9 in vitro at Ki levels lower than 50°C _{max,unbound} , indicating that an in vivo interaction may be possible. However, the in vivo study with the CYP2C8 substrate rosiglitazone showed no relevant effect on rosiglitazone pharmacokinetics. Therefore, there should be no risk for clinically relevant effects on CYP2C8 or CYP2C9 substrates.

Opmerkingen

PubMed: geen informatie

Stockley, Hansten: geen informatie

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	Ja	Nee	14 januari 2015

Ter informatie: Warfarine + vismodegib

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Lim S. Am J Health Syst Pharm. 2014;71:200-3. doi: 10.2146/ajhp130093.	warfarine + vismodegib	toename INR van gem. 2.3 (streefwaarde 2.0-3.0) naar 4.6, binnen 3 weken na start vismodegib 150 mg 1dd bij man (78) met BCC gedurende 9 maanden stabiel op warfarine en comedatie*. 1 dosis warfarine overgeslagen en INR veelvuldig gemeten over 3 weken, INR 9.5; geen bloeding. Bij INR 9.5 warfarine onderbroken, 2 dagen later nog INR 9.3. Na weer 3 dagen zonder warfarine INR 2.6. Herstart warfarine in 32% lagere weekdosis, INR 5.6 na 1 week. Dosis verder verlaagd tot 36% lagere weekdosis tov origineel, INR 2.9 na 1 week en 4.7 na nog een week bij ziekenhuisopname wegens andere complicaties. * Comedatie: hydrochloorthiazide, pravastatine, fluoxetine, ijzersulfaat en fenytoïne. Auteurs: patiënt was 8.2 kg afgevallen na 2 maanden behandeling met vismodegib (bekende bijwerking), had geen diarree of gewijzigd eetpatroon.	(1C)