

Nintedanib + Ketoconazol

M1253

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Luedtke D. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 2018;43:533-41.	nintedanib + ketoconazol	nintedanib met vs zonder ketoconazol: AUC nintedanib 1.6x hoger (61.3 vs 38.6 ng*h/ml); Cmax 1.8x hoger (7.13 vs 4.19 ng/ml) Regime: ketoconazol 400 mg/dag gedurende 3 dagen, nintedanib 50 mg 1-malig 1 uur na de laatste dosis ketoconazol en zonder ketoconazol (wash out ≥ 14 dagen); 26 vrijwilligers	3A
SPC Vargatef	nintedanib + ketoconazol	toename AUC nintedanib 1,6x en Cmax 1,8x bij combinatie met ketoconazol → zelfde getallen als Luedtke	2A

Overig	Stof	Effect
SPC Vargatef EPAR: geen extra info	nintedanib + P-gp-remmers	krachtige P-gp-remmers (bijv. ketoconazol of erytromycine) kunnen de blootstelling aan nintedanib verhogen. Controleer op verdraagbaarheid; onderbreking, dosisverlaging of staken van de behandeling kan nodig zijn.

Opmerkingen

PubMed: geen gegevens.

Risicogroep	
-------------	--

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	14 januari 2015