

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Bojdani E. Psychiatry Res 2019;279:284-6. doi: 10.1016/j.psychres.2019.05. 009.	desmopressine + meloxicam	tonisch-clonisch insult, hyponatriëmie (Na-spiegel 121 mmol/l), 2 weken na start meloxicam 15 mg/dag bij man op desmopressine 0.2 mg oraal voor de nacht; meloxicam gestaakt en desmopressine geleidelijk verlaagd. Man (50-er) had meervoudige psychiatrische aandoeningen waaronder schizofrenie en veel medicatie, oa clozapine, lamotrigine, fluoxetine.	1E
Garcia EBG. Haemophilia 2003;9:232-4.	desmopressine + ibuprofen	hyponatriëmisches coma (Na-spiegel 121 mmol/l; ref.waarde 135-145 mmol/l), 2 dagen na tandheelkundige ingreep, desmopressine profylaxe vóór de ingreep en ibuprofen erna, bij vrouw (55) met ziekte van Von Willebrand. Na waterrestrictie herstel na 24 uur. Voorheen nooit problemen bij gebruik desmopressine bij kleine chirurgische ingrepen.	1E
Verrua E. Hormones 2013; 12:135-41.	desmopressine + ketoprofen	tonisch-clonisch insult en coma, ernstige hyponatriëmie, lactaat acidose en rhabdomyolyse, 3 dagen na start ketoprofen 200 mg/dag bij man (50) op desmopressine vanwege diabetes insipidus;. Na behandelen symptomen waterintoxicatie en tijdelijk staken desmopressine herstel na 72 uur.	1E
Lareb Detailed Safetyreport 167863 niet gepubliceerd	desmopressine + ibuprofen	hyponatriëmie (113 mmol/l), 2 dagen na start ibuprofen bij vrouw (65) op desmopressine vanwege panhypopituitarisme na adenomectomie. Herstel na tijdelijke waterrestrictie en staken ibuprofen. Dosering desmopressine niet aangepast.	0E
Moses AM. J Clin Endocrinol Metab 1981;52: 910-3.	desmopressine + indometacine	toename effect desmopressine op urine-osmolaliteit van 450 mOsm/kg met alleen desmopressine naar 600 mOsm/kg icm indometacine (getallen afgeleid uit fig. 2 p. rechts boven p. 912); geen significant effect op urinevolume en in duur van effect desmopressine. Regime: indometacine 25 mg elke 6 uur gedurende 3 dagen, desmopressine 0,5 µg sc op dag 3 en vóór indometacine; 6 patiënten met diabetes insipidus. Referentiewaarde osmolaliteit urine: 275 – 300 mOsm/kg	3A

Overig	Stof	Effect
SPC Minrin	desmopressine + NSAID's	een versterkte, maar niet verlengde werking van desmopressine is gemeld bij combinatie met indometacine. Bij combinatie met indometacine, en mogelijk ook andere NSAID's, eventueel dosis desmopressine aanpassen, omdat NSAID's waterretentie/hyponatriëmie kunnen induceren.
SPC Indometacine, Ibuprofen, Ketoprofen	NSAID's	vochtretentie en oedeemvorming is gerapporteerd in associatie met NSAID's
Mercke Odeberg J. J Pharm Pharmacol 2004;56:1389-1398.	desmopressine + piroxicam	piroxicam steady state had geen significant effect op farmacokinetiek (AUC, t _{1/2} , klaring) en farmacodynamiek (urine-osmolaliteit, urine-flow) van desmopressine. Regime: i.v. desmopressine 2 µg (kinetisch) of 0,2 µg + hydratatie (dynamisch), piroxicam 20 mg dag 1, 10 mg dag 2-4; crossover studie; 16 vrijwilligers, washout periode 14 dagen

Opmerkingen

WFG: alleen klassieke NSAID's koppelen. Controle van gewichtstoename heeft geen zin, het gewicht kan sowieso per dag al een kg schommelen. Ook heeft controle van de Na-spiegel weinig zin omdat het effect al zo snel optreedt. Sowieso weinig drinken/vochtbeperking.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	24 maart 2015