

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
-			

Overig	Stof	Effect
SPC Veltassa	patiromeer + kalium	bewaak serumkaliumspiegel wanneer dit klinisch is geïndiceerd, o.a. nadat gebruik is gewijzigd van geneesmiddelen die invloed hebben op de concentratie kalium.
SPC Lokelma	natriumzirkonium cyclosilicaat + kalium	monitor serumkalium wanneer hier klinische indicatie voor is, bijvoorbeeld na aanpassingen aan geneesmiddelen die van invloed zijn op serumkaliumgehalte.
SPC Resonium A	polystyreen-sulfonzuur + kalium	gecontra-indiceerd bij kaliumspiegel < 5 mmol/l. De werkzaamheid wordt nadelig beïnvloed door gecombineerde toediening met substanties die veel kalium bevatten, zoals fruitmoes en vruchtensappen.
SPC Sorbisterit	polystyreen-sulfonzuur + kalium	conform SPC Resonium A. Therapie met Sorbisterit moet ondersteund worden met andere maatregelen zoals beperking van de kaliuminname.
SPC Slow-K	kalium + polystyreen-sulfonzuur	bij acute vergiftiging met Slow-K kan overmatig kalium o.a. verwijderd worden door toediening van een kationwisselaar hars (zoals natrium polystyreensylfaat)

Opmerkingen

PubMed: geen studies interactie tussen polystyreensulfonzuur en kaliumpreparaten.

WFG: Kaliumbinders en kaliumzouten gaan elkaars werking tegen. Er is geen indicatie te bedenken waarbij een kaliumbinder en een kaliumzout naast elkaar gebruikt moeten worden. Bewaking is echter wel gewenst omdat dit in de praktijk onbedoeld kan voorkomen.

Gekozen is om alleen te bewaken op preparaten waarin kalium de primair werkzame stof is. Bij andere preparaten waarin kalium zit, gaat dit om een kleine hoeveelheid als hulpstof of gaat het om fysiologische hoeveelheden.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	24 november 2015