

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
Pujalte G. Clin J Sport Med 2014;24:e52-53.	pravastatine + tadalafil	pijn bilateraal knieën (rechts erger) en linker elleboog, stijfheid vooral 's ochtends, vermoeidheid, pijn rechter kaak na start tadalafil dagelijks, bij man (59 j) op oa pravastatine. Binnen 3 dagen na staken van tadalafil pijnklachten weg. De man had hyperlipidemie, hypertensie, ED, reflux; comedatie lisinopril, zolpidem, ranitidine. Behalve tadalafil gebruikte hij de medicatie al jaren. Auteurs: mogelijk toename pravastatine door tadalafil via CYP3A4. Of toename tadalafil door pravastatine, tadalafil zelf kan ook myopathie veroorzaken. → WFG: niet onderbouwend: dosering tadalafil en tussentijd start tadalafil en start klachten niet bekend, klachten betreffen artralgie en niet myopathie, CK niet gemeten; pravastatine is geen CYP3A-substraat. DIPS-score 0-1.

Opmerkingen

Geen informatie in de SPC's sildenafil, tadalafil, simvastatine, atorvastatine, rosuvastatine of pravastatine

Hansten, Stockley: geen info.

PubMed: verder geen informatie interactie andere statines en fosfodiesteraseremmers.

Alfanum. code	--		
---------------	----	--	--

Risicogroep	
-------------	--

	Code	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	--	Nee	Nee	10 mei 2016