

Apixaban + Diltiazem

M1365

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Frost CE. Br J Clin Pharmacol 2015;79:838-46. doi: 10.1111/bcp.12541.	apixaban + diltiazem	↑apixaban Cmax 1.3x en AUC 1.4x; geen wijziging t _{1/2} . Regime: apixaban 10 mg op dag 1+11 en diltiazem 360 mg 1dd op dag 4-13; 18 vrijwilligers.	3A
SPC Eliquis	apixaban + diltiazem	GIC: getallen uit Frost 2015. toename AUC apixaban 1.4x en Cmax 1.3x door diltiazem 360 mg 1dd	1A

Overig	Stof	Effect
SPC Eliquis	apixaban + diltiazem	geen dosisaanpassing nodig bij minder krachtige remmers zoals diltiazem.
Heidbuchel H. Europace 2015;17:1467-507. doi: 10.1093/europace/euv309. Richtlijn Atriumfibrilleren van de European Society of Cardiology (ESC) - Update 2015.	apixaban + diltiazem	overweeg dosisverlaging naar 2.5 mg 2dd bij ≥2 risicofactoren

Opmerkingen

WFG 22-11-16: actie Nee voor diltiazem. Resultaat zoekactie CBG: 'de data in de SmPC zijn gebaseerd op uitgevoerde studies met Diltiazem. De data in de SmPC zijn conform de studieresultaten en de klinische relevantie van het effect is onbekend. Actie 'nee' lijkt mij goed.'

Stockley, Hansten: geen gegevens.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	22 november 2016