

# Valproïnezuur + Guanfacine

# M1388

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Ambrosini PJ. J Child Adolesc Psychopharmacol 1998;8:143-7.	valproïnezuur + guanfacine	2 patiënten op guanfacine + valproïnezuur. #1, jongen 8 jaar: afname spiegel valproïnezuur met 41% (van 128 naar 76 µg/ml) <u>na staken</u> guanfacine. Guanfacine 3 mg/dag, valproïnezuur 875 mg/dag. #2, meisje 9 jaar: afname spiegel valproïnezuur 19% (van 132 naar 107 µg/ml) <u>na staken</u> guanfacine; guanfacine 1 mg 3 dd, valproïnezuur 375 mg 3 dd; herstart guanfacine 1 mg 3 dd, daarna weer toename spiegel valproïnezuur 1.3x (van 107 naar 142 µg/ml).	1A

Overig	Stof	Effect
SPC Intuniv	valproïnezuur + guanfacine	gelijktijdige toediening met valproïnezuur kan leiden tot verhoogde concentraties valproïnezuur. Mechanisme van deze interactie is niet bekend. Zowel guanfacine als valproïnezuur wordt gemetaboliseerd door glucuronidatie, mogelijk hierdoor concurrerend remmend effect. Bij combinatie: monitor op mogelijke additieve effecten van het centrale zenuwstelsel, overweeg monitoring valproïnezuur. Aanpassingen dosis valproïnezuur en Intuniv kunnen geïndiceerd zijn.

## Opmerkingen

Stockley, FDA Label Information:--

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Nee	14 februari 2017