

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC Intuniv	guanfacine + ketoconazol	toename AUC guanfacine 3x en Cmax 2x bij combinatie met ketoconazol. Andere CYP3A4/5-remmers kunnen vergelijkbaar effect hebben. Combinatie verhoogt het risico op bijwerkingen, zoals hypotensie, bradycardie en sedatie. Verlaag dosis guanfacine met 50% bij combinatie met krachtige en matig krachtige CYP3A-remmers. Vanwege variabiliteit in het effect van interactie kan een verdere dosistitratie noodzakelijk zijn.	1A

Overig	Stof	Effect
SPC Intuniv	guanfacine	klachten en verschijnselen van overdosering kunnen bestaan uit hypotensie, initiële hypertensie, bradycardie, lethargie en respiratoire depressie. Hemodynamische instabiliteit is ook in verband gebracht met een overdosering van guanfacine van 3 maal de aanbevolen dagelijkse dosis.

Opmerkingen

Stockley, Pubmed: --

WFG: in advies niet opnemen om guanfacine tijdens een kuur met azolen of macroliden tijdelijk te staken (zoals bij de interactie met simvastatine); vanwege risico op stijging bloeddruk is het belangrijk guanfacine uit te sluiten. Advies tijdelijk staken brengt risico met zich mee dat te plotseling wordt gestaakt. Gezien de indicatie (ADHD) is tijdelijk staken van guanfacine waarschijnlijk meestal ook niet mogelijk.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	14 februari 2017