

Dialyse peritoneaaldialyse: meropenem

5750

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
--			

Overig	Opmerkingen
SPC meropenem 11-09-18.	Er zijn geen vastgestelde doseringsaanbevelingen voor peritoneale dialysepatiënten. Meropenem wordt geklaard door hemodialyse en hemofiltratie. De vereiste dosis dient te worden toegediend na beëindiging van de hemodialysecyclus. ClCr < 10 ml/min: 50% elke 24 uur.
Vlaar PJ ea. Intraperitoneal compared with intravenous meropenem for peritoneal dialysis-related peritonitis. Perit Dial Int 2013;33:708-9.	Na meropenem 1 g/dag iv resp. ip toediening AUC 376 mg*h/l resp. 325 mg*h/l bij een man (72) met peritonitis. Tov de literatuur bij patiënten met normale nierfunctie AUC 150-200 mg*h/l na meropenem iv 1 g 3dd. Regime: eenmaal daags 1 gram meropenem.

Opmerkingen:

- Werkgroep 27-09-2021: ook bij advies PD relatieve dosisaanpassing ipv advies met vaste keerdosis in het kader van consistentie.

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Ja	Onbekend	27 september 2021