

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Floxapen 30 juli 2015	Bij creatinineklaring <10 ml/min: overweeg verlaging dosering of verlenging doseringsinterval. Aanbevolen dosering: 1000 mg elke 8-12 uur. Geen informatie over peritoneale dialyse.

Opmerkingen:

- Werkgroep 11-3-2020: de neurologische bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Bij behandeling met hoge dosering flucloxacilline (8-12 g/dag): na 10 dagen behandeling in overleg met infectioloog of Antibioticateam beoordelen of dosering moet worden aangepast en spiegelbepaling moet worden overwogen om onderbehandeling te voorkomen. Spiegelbepaling heeft alleen zin indien ook de gevoeligheid (MIC) van het te bestrijden micro-organisme bekend is. Bij flucloxacilline dient er rekening mee te worden gehouden dat bepaalde methoden gebruik maken van oxacilline als referentiestof en het de vraag is of het resultaat voor oxacilline 1:1 te vertalen is naar flucloxacilline.

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	11 maart 2020