

Dialyse peritoneaaldialyse: gentamicine parenteraal

6147

PD = peritoneale dialyse,

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Hamann SR et al. Evaluation of gentamicin pharmacokinetics during peritoneal dialysis. Ther Drug Monit. 1982;4:297-300.	2	Patiënt 1: tijdens PD $t_{1/2}$ 6,5 uur, Cl_{totaal} 22,6 ml/min off dialysis: $t_{1/2}$ 30,8 uur, Cl_{totaal} 4,5 ml/min Patiënt 2: tijdens PD $t_{1/2}$ 7,1 uur, Cl_{totaal} 19,8 ml/min off dialysis: $t_{1/2}$ 26,7 uur, Cl_{totaal} 7,5 ml/min. Regime: 1,5 mg/kg gentamicine bij start 11- uur durende PD (afgeleid uit grafieken) en na einde dialyse (als vorige dosis niet meer te detecteren was in bloed)	Auteurs: gentamicine duidelijk verwijderd door PD, de bijdrage van PD aan totale lichaamsklaring nog niet duidelijk bewezen.

Overig	Opmerkingen
-	

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Ja	Ja	5 juli 2016