

Dialyse peritoneaaldialyse: aceclofenac

6202a

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Biofenac 11 juli 2016	Gecontraïndiceerd bij ernstige nierfunctiestoornissen. Dialyse heeft vermoedelijk geen nut vanwege hoge eiwitbinding en intensieve stofwisseling van prostaglandinesyntheseremmende middelen.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: celecoxib

6202b

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Celebrex 16 juli 2015	Gecontraïndiceerd bij creatinineklaring <30 ml/min. Dialyse is naar verwachting geen efficiënte methode voor het verwijderen van het geneesmiddel, vanwege een hoge eiwitbinding.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: ketoprofen/dexketoprofen

6202c

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Orudis 10 september 2015	Gecontraïndiceerd bij ernstige nierfunctiestoornis. Geen info over peritoneale dialyse.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: diclofenac

6202d

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-	-	-

Overig	Opmerkingen
SPC Voltaren K 26 juni 2014	Gecontraïndiceerd bij ernstig nierfalen. Geen info over peritoneale dialyse.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: etoricoxib

6202e

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-	-	-

Overig	Opmerkingen
SPC Arcoxia 14 maart 2015	Gecontraïndiceerd bij een creatinineklaring van < 30 ml/min. Het is niet bekend of etoricoxib door peritoneale dialyse dialyseerbaar is.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: fenylbutazon

6202f

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-	-	-

Overig	Opmerkingen
SPC Butazolidin 6 oktober 1969	Gecontraïndiceerd bij ernstige nierfunctiestoornis. Geen info over peritoneale dialyse.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: ibuprofen/dexibuprofen

6202g

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-	-	-

Overig	Opmerkingen
SPC Advil 3 februari 1987	Gecontraïndiceerd bij ernstig verminderde nierfunctie. Hemodialyse niet zinvol omdat ibuprofen grotendeels en eiwit is gebonden en sterk wordt gemetaboliseerd.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: indometacine

6202h

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			-

Overig	Opmerkingen
SPC Indometacine TEVA 15 juni 2012	Bij ernstige nierfunctiestoornis: monitoring nodig, lagere dosis nodig om excessieve stapeling te voorkomen. Geen info over peritoneale dialyse.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: meloxicam

6202i

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-		-

Overig	Opmerkingen
SPC Movicox 8 mei 2010	Contraïndicatie: ernstige nierinsufficiëntie indien niet gedialyseerd wordt Bij dialysepatiënten met ernstige nierinsufficiëntie dient de dosis van 7,5 mg per dag niet te worden overschreden.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: metamizol

6202j

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-		-

Overig	Opmerkingen
SPC Novalgin 23 september 2002 (inmiddels niet meer beschikbaar omdat er een parallelproduct van Novalgin beschikbaar is)	Geen info over peritoneale dialyse.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: nabumeton

6202k

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-		-

Overig	Opmerkingen
SPC Mebutan 26 april 1991	Nabumeton gecontraïndiceerd bij ernstige nierinsufficiëntie (Clcr 30 ml/min). Nabumeton is een prodrug die na opname snel in de werkzame metaboliet 6-MNA wordt omgezet. Door de hoge binding van plasma-eiwitten is 6-MNA niet dialyseerbaar.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: naproxen

6202I

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			-

Overig	Opmerkingen
SPC Aleve september 2010	Contraïndicatie: nierinsufficiëntie. Hemodialyse vermindert de plasmaconcentratie niet, vanwege de hoge eiwitbinding.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: parecoxib

6202m

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-		-

Overig	Opmerkingen
SPC Dynastat 22 maart 2002	Bij Clcr < 30 ml/min parecoxib starten met laagst aanbevolen dosis (20 mg). Nauwgezette controle nierfunctie nodig. Valdecoxib (actieve metaboliet parecoxib) heeft een hoge eiwitbinding. Geen info over peritoneale dialyse.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: piroxicam

6202n

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-		-

Overig	Opmerkingen
SPC Piroxicam PCH 3 juli 1991	Bij patiënten met nierinsufficiëntie wordt aanbevolen behandeling te beginnen met 10 mg per dag, daarna zo nodig verhogen tot 20 mg per dag. In geval van gecombineerde lever- en nierinsufficiëntie is piroxicam gecontraïndiceerd. Hemodialyse is niet effectief. Over peritoneale dialyse geen opmerkingen in SPC. Eiwitbinding is hoog.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: propyfenazon

6202o

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-	-		-

Overig	Opmerkingen
SPC Saridon januari 2004	Geen info over peritoneale dialyse.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: tiaprofeenzuur

6202p

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Surgam 3 februari 1983	Bij Crcl <30 ml/min stijgt $t_{1/2}$ tot 4-6 uur ($t_{1/2}$ bij normale nierfunctie ± 2 uur). Hemodialyse niet zinvol door hoge eiwitbinding.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016

Dialyse peritoneaaldialyse: salicylaten analgetisch

6202q

PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Ascal 22 april 2009	Gecontraïndiceerd bij ernstige nierfunctiestoornis. Geen info over peritoneale dialyse.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016