

Dialyse peritoneaaldialyse: levofloxacin inhalatie

6354

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse, PD = peritoneale dialyse.

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Quinsair 26 maart 2015.	De effecten van nierinsufficiëntie op de farmacokinetiek van door inhalatie toegediende levofloxacin zijn niet onderzocht. Er werden echter geen dosisaanpassingen gemaakt in klinische onderzoeken. Bij patiënten met $\text{Clcr} \geq 20 \text{ ml/min}$ (Cockcroft-Gault) is geen aanpassing van de dosis nodig. Bij patiënten met $\text{Clcr} \leq 20 \text{ ml/min}$ wordt gebruik niet aanbevolen. PD en CAPD niet effectief om levofloxacin uit het lichaam te verwijderen. Systemische blootstelling na inhalatie ongeveer 50% lager dan na systemische toediening van vergelijkbare doses. Variabiliteit is echter sterk, soms valt serumconcentratie na inhalatie binnen het bereik van systemische toediening.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Nee	Nee	5 juli 2016