

Dialyse peritoneaaldialyse ofloxacin

6374

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
McMullin CM ea. The pharmacokinetics of once-daily oral 400 mg ofloxacin in patients with peritonitis complicating continuous ambulatory peritoneal dialysis. J Antimicrob Chemother 1997;39:829-31.	1	15,4% van ofloxacinedosis verwijderd door CAPD bij 7 patiënten met eindstadium nierfalen die CAPD ondergingen en oraal 400 mg ofloxacin kregen 7 dagen lang.	Auteurs: 400 mg 1 maal daags 7 dagen geeft dialysaat- en serumconcentraties effectief tegen peritonitis.
Passlick J ea. Single- and multiple-dose kinetics of ofloxacin in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Perit Dial Int 1989;9:267-72.	2	T _{1/2} 26,8 uur (tov literatuur: t _{1/2} 3-7 uur bij normale nierfunctie) 4,2% van ofloxacinedosis verwijderd door CAPD, bij 6 patiënten die 1-malig oraal 200 mg ofloxacin kregen.	Auteurs: oplaaddosis van 400 mg gevolgd door onderhoudsdosis van 200 mg per dag.
Flor S ea. Pharmacokinetics of ofloxacin in healthy subjects and patients with varying degrees of renal impairment. Int J Clin Pharmacol Res 1991;11:115-21. Abstract. Artikel niet in bezit GIC.	1	6-15% van de ofloxacinedosis verwijderd door CAPD in studie bij 18 patiënten waaronder enkele patiënten op CAPD.	Auteurs: geen extra dosis nodig tijdens CAPD.

Overig	Opmerkingen
SPC ofloxacin PCH 24 juli 2014	Creatinineklaring <20 ml/min of HD of PD: 100 mg per 24 uur of 200 mg per 48 uur. Controle serumconcentratie nodig bij dialyse.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Nee	Ja	5 juli 2016