

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse, PD = peritoneale dialyse.

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Klacid 10 december 2006	Bij patiënten met een verminderde nierfunctie met een Clcr < 30 ml/min dient de claritromycinedosis te worden gehalveerd: 250 mg per dag of bij ernstige infecties 250 mg 2 maal daags. Omdat de tablet niet kan worden gehalveerd moet minimaal 500 mg per dag worden gegeven, daarom gecontra-indiceerd bij Clcr < 30 ml/min. Zoals ook het geval is met andere macroliden heeft peritoneale dialyse waarschijnlijk weinig invloed op de serumspiegels van claritromycine. Volgens fabrikant zijn er geen studies gedaan naar effect dialyse op klaring (maart 2016).
Steinman MA ea. Clarithromycin-associated visual hallucinations in a patient with chronic renal failure in continuous ambulatory peritoneal dialysis. Am J Kidney Dis 1996;27:143-6.	Een CAPD patiënt krijgt visuele hallucinaties bij het gebruik van relatief hoge doses claritromycine. Er was al sprake van aluminiumintoxicatie (uit Nierfunctie: claritromycine 1703).

**Opmerkingen:**

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	24 juni 2019