

Dialyse peritoneaaldialyse: ranitidine

6439

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse, PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Sica DA ea. Ranitidine pharmacokinetics in continuous ambulatory peritoneal dialysis. Eur J Clin Pharmacol 1987;32:587-91.	1	CAPD verwijderde 0,9-1,3% van de dosis bij 6 patiënten die ranitidine 50 mg iv of 150 mg oraal kregen.	Auteurs: na zowel iv als orale toediening was Cl_{CAPD} te verwaarlozen. Een extra dosis is niet nodig. 1 x daags 150 mg lijkt genoeg.

Overig	Opmerkingen
SPC Zantac 7 mei 2014.	Bij ernstige nierfunctiestoornis 150 mg 's avonds. Geen informatie over PD.

Opmerkingen:

- Werkgroep: voorkeur heeft vermijden, maar indien echt een H2-antagonist is geïndiceerd, kan op basis van studie van Comstock TJ ea (1988) 1 x per dag 150 mg ranitidine worden gegeven.

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Nee	Ja	8 november 2016