

# Dialyse peritoneaaldialyse: rosuvastatine

6451

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse

| Onderbouwend | Bewijs | Effect | Opmerkingen |
|--------------|--------|--------|-------------|
| -            |        |        |             |

| Overig                                                                                                                                                          | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPC Crestor 21 januari 2016.                                                                                                                                    | Uit onderzoek bleek dat patiënten die hemodialyse ondergaan plasmaconcentraties bij steady state ongeveer 50% hoger zijn dan bij gezonde vrijwilligers.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bologa R ea.<br>Pharmacokinetics of rosuvastatin in patients with end-stage kidney disease undergoing peritoneal dialysis.<br>Clin Nephrol. 2009 Dec;72:437-41. | Auteurs: farmacokinetisch profiel rosuvastatine bij CAPD gelijk aan dat bij gezonde vrijwilligers, maar verschillend van dat bij patiënten met ernstig nierfalen. Rosuvastatine mogelijk gedeeltelijk geklaard door CAPD. $T_{1/2}$ volgens auteurs niet te bepalen omdat bij 5 van de 10 patiënten plasmaconcentratie na 48 uur lager was dan detectielimiet. Advies auteurs: bij CAPD dosering van $\leq 10$ mg, zonder verdere dosisaanpassing. |

## Opmerkingen:

|                      | Wijziging kinetiek | Effect dialyse | Actie | Datum           |
|----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|
| Beslissing werkgroep | Ja                 | Onbekend       | Ja    | 8 november 2016 |