

PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Forxiga (dapagliflozine) 12 november 2012.	Werkzaamheid dapagliflozine afhankelijk van nierfunctie. Werkzaamheid naar verwachting afwezig bij ernstige nierinsufficiëntie. Bij Crcl 60 < ml/min of eGFR < 60 ml/min/1,73 m ² moet dapagliflozine worden gestopt. Verwijdering van dapagliflozine door hemodialyse is niet onderzocht.
Scientific discussion Forxiga (dapagliflozine) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002322/WC500136024.pdf	Forxiga has not been studied in severe renal impairment (CrCl < 30 ml/min or eGFR < 30 ml/min/1.73 m ²) or end stage renal disease (ESRD).
SPC Invoka (canagliflozine) 30-4-2019.	canagliflozine niet gebruiken bij patiënten met ESRD of bij dialysepatiënten, aangezien het bij dergelijke populaties naar verwachting niet werkzaam is
SPC Jardiance (empagliflozine) 27-2-2019.	Empagliflozine dient niet te worden gebruikt bij patiënten met terminale nierziekte (ESRD) of bij dialysepatiënten, aangezien niet wordt verwacht dat het bij deze patiënten effectief is.
SPC Steglatro (ertugliflozine) 16-10-18.	Vanwege het werkingsmechanisme is de werkzaamheid van ertugliflozine afhankelijk van de nierfunctie. Bij ESRD en dialyse: niet gebruiken, niet effectief.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	24 juni 2019