

Dialyse hemodialyse: triamtereen

6480

HD = hemodialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC triamtereen PCH 2 april 2013	Gecontraïndiceerd bij progressieve nierinsufficiëntie, met toenemende oligurie en uremie gedurende de behandeling en bij verminderde nierfunctie, waarbij de serumcreatinine hoger is dan 200 µmol/l.
Grebien B ea. Zur Pharmakokinetik von triamteren und seinen wirksamen Metaboliten bei eingeschränkter Nierenfunktion. Arzneim Forsch/Drug Res 1978;28:1420-25.	Bij 5 hemodialyse patiënten werden na éénmalig 100 mg triamtereen dialysewaarden tussen 2-4 ml/min gevonden voor triamtereen en OH-triamtereenester. Verhouding plasmaconcentratie : dialyseconcentratie 100: 1 voor triamtereen, 200:1 voor OH-triamtereenester. Plasma- en dialyseconcentraties verliepen tijdens onderzoeksperiode gelijk.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Nee	Ja	24 januari 2017