

Dialyse peritoneaaldialyse: fexofenadine

6514

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse, PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Ishiguro M ea. Effect of terfenadine on uremic itching in dialysis patients. Journal of Japanese Society for Dialysis Therapy 2010;25:1329-1336. Abstract. Artikel niet in bezit GIC. Artikel niet te vinden via Pubmed, raadplegen via http://www.readcube.com/articles/10.4009/jsdt1985.25.1329 (Japans, alleen samenvatting in Engels)	1	$T_{1/2}$ fexofenadine tijdens CAPD 67 uur (tov 11-15 uur bij normale nierfunctie (SmPC) bij (totaal 20, maar onbekend hoeveel op CAPD) patiënten op CAPD die 4 weken lang dagelijks 2 x 60 mg terfenadine per dag kregen.	Auteurs: bij verminderde nierfunctie lagere dosis nodig.

Overig	Opmerkingen
SPC Telfast 4 november 2013.	Bij nierfunctiestoornissen voorzichtig toepassen. Geen informatie over PD.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	24 januari 2017