

Dialyse peritoneaaldialyse: cefalexine

6194

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse, PD = peritoneale dialyse.

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Keforal 02-02-2015	Patiënten met nierinsufficiëntie: Oplaaddosis van 1-2 gram. Verder doseringsschema bepalen op geleide van creatinineklaring: Interval 48 uur bij Clcr < 5 ml/min Interval 24 uur bij Clcr < 15 ml/min Interval 8-12 uur bij 15 ml/min > Clcr < 50 ml/min
Bunke CM ea. Cefazolin and cephalexin kinetics in continuous ambulatory peritoneal dialysis. Clin Pharmacol Ther 1983;33:66-72.	T _{1/2} 8,6 uur, AUC 489 mg/uur/l, Cl _{plasma} 18,47 ml/min, Cl _{CAPD} 2,29 ml/min bij 5 patiënten op CAPD die oraal 500 mg cefalexine kregen. Auteurs: peritoneale klaring beperkt. Dosis als bij verminderde nierfunctie. Peritoneale concentraties na orale toediening erg wisselend. Daarom ip-toediening beter. Orale toediening lijkt ook minder effectief bij peritoneale infectie: bij één patiënt was cefalexine niet te detecteren in bloed.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	5 juli 2016