

Dialyse hemodialyse: fexofenadine

6513

HD = hemodialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Ishiguro M ea. Effect of terfenadine on uremic itching in dialysis patients. Journal of Japanese Society for Dialysis Therapy 2010;25:1329-1336. Abstract. Artikel niet in bezit GIC. Artikel niet te vinden via Pubmed, raadplegen via http://www.readcube.com/articles/10.4009/jstdt1985.25.1329	1	T _{1/2} fexofenadine 5,8 uur, AUC 6,917 ng/uur/ml tijdens dialysedagen, t _{1/2} 5,1 uur, AUC 7,421 ng/uur/ml op niet-dialysedagen bij 20 patiënten op HD die 4 weken lang dagelijks 2 x 60 mg terfenadine per dag kregen.	Auteurs: bij verminderde nierfunctie lagere dosis nodig.

Overig	Opmerkingen
SPC Telfast 4 november 2013.	Bij nierfunctiestoornissen voorzichtig toepassen. Hemodialyse verwijdert fexofenadine onvoldoende bij overdosering.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Nee	Ja	24 januari 2017