

DRUID = Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co-ordination and synthesis report. 2011.	Niet geëvalueerd. Er is geen categorie-indeling gemaakt, omdat dit geneesmiddel in de meeste Europese landen, inclusief Engeland en Ierland, niet verkrijgbaar is.	
ref. 2 SPC Ketanest-S 19-12-2013.	De behandeling met (S)-(+)-ketamine kan het reactievermogen verminderen. Hiermee dient rekening te worden gehouden in situaties die bijzondere alertheid vereisen, zoals het besturen van een auto. Na de narcose met (S)-(+)-ketamine mag de patiënt gedurende tenminste 24 uur niet autorijden of machines bedienen. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: Reacties tijdens de recovery. Hieronder vallen levendige dromen, waaronder nachtmerries, duizeligheid en motorieke onrust (frequentie: 1-10%). Hallucinaties, dysforie, angst en desoriëntatie, wazig zien (frequentie: 1-10%). Tonische en klonische bewegingen die op convulsies lijken (als gevolg van toegenomen spiertonus), diplopie, nystagmus (frequentie 0,1-1%).	

Opmerkingen:

DRUID classificatiesysteem:

- Categorie 0: geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie I: weinig invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: matige invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige invloed op de rijvaardigheid.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft esketamine ingedeeld in categorie III op basis van het groepseffect.

Het advies voor incidenteel gebruik is gebaseerd op farmacokinetische gegevens, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de invloed op de rijvaardigheid. Daarom wordt het autorijden ontraden gedurende 24 uur.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum	Ja	Ja	III	26-11-2014