

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, DRUID = Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines, ICADTS = International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 ICADTS: Drug-list. 2007. Summary Report: Categorization system for medicinal drugs affecting driving performance. 2007.	Categorie III: Ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een alcoholconcentratie van > 0.8 g/l (> 0.8‰).	Geldt voor de normale therapeutische dosering voor volwassenen bij de hoofdindicatie. Rijveilige alternatieven: Citalopram (cat.I) Escitalopram (cat.I) Fluoxetine 20 mg 1x per dag (cat.I) Fluvoxamine (cat.I) Paroxetine 20 mg 1x per dag (cat.I) Sertraline (cat.I) Moclobemide 200 mg 2x per dag (cat.I) Venlafaxine 75-150 mg per dag (cat.I) Let op: De doseringen van ICADTS kunnen afwijken van de gebruikelijke doseringen in Nederland.
ref. 2 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	Wegens het sedatief vermogen van mianserine is autorijden tijdens de behandeling af te raden. Het BIVV deelt mianserine in categorie III in.	Categorie III (BIVV): Geneesmiddelen die, op basis van wetenschappelijke studies, waarschijnlijk een matige invloed op de rijvaardigheid kunnen veroorzaken. Algemeen advies bij categorie III: Aanraden om geen wagen te besturen.
ref. 3 Ramaekers JG. Antidepressants and driver impairment: empirical evidence from a standard on- the-road test. J Clin Psychiatry 2003;64(1):20-29.	Review: Uit een studie met een rijtest op de weg 16 uur na inname van mianserine door 18 gezonde vrijwilligers is gebleken, dat dosering van 30 mg voor de nacht gedurende 7 dagen, gevolgd door 60 mg voor de nacht gedurende 8 dagen de rijvaardigheid op dag 7 significant verslechterd. Deze verslechtering was echter vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie lager dan 0,5‰. Bij meting op dag 1, 8 en 15 was het verschil ten opzichte van placebo niet significant. Uit studies met rijtesten op de weg is gebleken, dat inname van 10-20 mg mianserine 3x daags de rijvaardigheid significant verslechtert. Bij gebruik gedurende 7 dagen verbetert de rijvaardigheid enigszins, maar is deze nog steeds onvoldoende. De rijvaardigheid is vergelijkbaar met bloedalcoholconcentraties van 0,8‰ of hoger.	Conclusie van de auteur(s): Sederende antidepressiva (waaronder mianserine) hebben met name in de eerste week een negatieve invloed op de rijvaardigheid. Aangezien er geen medische reden is voor het innemen van antidepressiva verdeeld over de dag, moeten voorschrijvers overwegen om sederende antidepressiva in 1 dosering voor de nacht voor te schrijven.

Opmerkingen:

DRUID classificatiesysteem:

- Categorie 0: geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie I: weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid.

ICADTS classificatiesysteem:

- Categorie I: geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum	Ja	Ja	III	28-12-2007