

Verkeersdeelname: baclofen – cat.II

3019

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, ICADTS = International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 ICADTS: Drug-list. 2007. Summary Report: Categorization system for medicinal drugs affecting driving performance. 2007.	Geen gegevens.	
ref. 2 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	Geen gegevens.	
ref. 3 SPC Lioresal 24-09- 2010.	Lioresal kan geassocieerd worden met duizeligheid, sedatie, slaperigheid en visusstoornissen waardoor het reactievermogen van de patiënt verminderd kan zijn. Patiënten die dergelijke symptomen ervaren, dienen geadviseerd te worden geen auto te besturen of machines te bedienen. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: bij meer dan 10%: sedatie, slaperigheid; bij 1-10%: verwarde toestand, slapeloosheid, hallucinaties, uitputting, duizeligheid, accommodatiestoornissen, visusstoornissen en vermoeidheid; verder zijn gemeld: verlaging van de convulsiedrempel en convulsies, in het bijzonder bij epileptische patiënten. Bijwerkingen zoals sedatie en slaperigheid treden vooral aan het begin van de behandeling op en zijn doorgaands van voorbijgaande aard.	

Opmerkingen:

ICADTS classificatiesysteem:

- Categorie I: geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid.

De projectgroep Geneesmiddelen bij Verkeersdeelname van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft baclofen ingedeeld in categorie II op basis van de informatie uit het SPC.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing projectgroep	Ja	Ja	II	22-02-2011