

Verkeersdeelname: urologische parasymphathicolyltica – cat.I

3340
t/m 3344

darifenacine, fesoterodine, flavoxaat, solifenacine, tolterodine

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, ICADTS = International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 ICADTS: Drug-list. 2007. Summary Report: Categorization system for medicinal drugs affecting driving performance. 2007.	Geen gegevens.	
ref. 2 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	Geen gegevens.	
ref. 3 SPC Emselex 21-01-2010	Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten op de rijvaardigheid. Patiënten die onderstaande bijwerkingen ondervinden, zouden niet moeten rijden of machines gebruiken. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: bij minder dan 1%: duizeligheid, wazig zicht, slaperigheid en slapeloosheid.	
ref. 4 SPC Toviaz 11- 11-2010	Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten op de rijvaardigheid. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die last hebben van bijwerkingen als wazig zien, duizeligheid en slaperigheid. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: bij 1-10%:duizeligheid en slapeloosheid bij minder dan 1%: slaperigheid en vermoeidheid.	
ref. 5 Product information Urispas: http://www.drugs.com/uk/urispas-200mg-film-coated-tablets-spc-7770.html	In geval van slaperigheid, wazig zicht en duizeligheid zou de patiënt niet moeten rijden of machines gebruiken. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: frequentie onbekend: slaperigheid, duizeligheid, verwardheid, wazig zicht en vermoeidheid.	

ref. 6 SPC Vesicare 31-05-2010	Solifenacine kan het vermogen om voertuigen te besturen of machines te bedienen negatief beïnvloeden vanwege de bijwerkingen. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: bij 1-10% van de patiënten: wazig zien; bij minder dan 1%: slaperigheid en vermoeidheid; verder is gemeld: hallucinaties, verwardheid en duizeligheid.	
ref. 7 SPC Detrusitol 30-03-2010	Het vermogen om voertuigen te besturen of machines te bedienen kan negatief beïnvloed worden door de bijwerkingen. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: bij 1-10% van de patiënten: duizeligheid, slaperigheid, abnormale visus en vermoeidheid; bij minder dan 1%: geheugenverlies; verder is gemeld: verwardheid, hallucinaties en desoriëntatie.	

Opmerkingen:

ICADTS classificatiesysteem:

- Categorie I: geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid.

De projectgroep Geneesmiddelen bij Verkeersdeelname van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft de urologische parasymphatholytica ingedeeld in categorie I op basis van de informatie uit de SPC's.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing projectgroep	Ja	Ja	I	04-01-2011