

Verkeersdeelname: flufenazine - cat.II

2057

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, CBR = Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, ICADTS = International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 ICADTS: Drug-list. 2007. Summary Report: Categorization system for medicinal drugs affecting driving performance. 2007.	Categorie II: Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een alcoholconcentratie van 0.5-0.8 g/l (0.5-0.8‰).	Geldt voor de normale therapeutische dosering voor volwassenen bij de hoofdindicatie.
ref. 2 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	In een studie met 53 patiënten met schizofrenie of andere psychosen werd bij dagelijkse dosering van 0,3 mg/kg ernstige extrapiramidale symptomen geconstateerd. Het BIVV deelt flufenazine in categorie II* in.	Categorie II* (BIVV): Geneesmiddelen waarvan een ernstige invloed op de rijvaardigheid onwaarschijnlijk is. Vanwege een gebrek aan voldoende experimentele gegevens kan de mate van beïnvloeding (matig, licht of geen) echter nog niet worden vastgesteld. Algemeen advies bij categorie II: Aanraden om geen wagen te besturen gedurende de eerste dagen of tot de patiënt zich bewust is van de effecten van het middel. Algemeen advies bij neuroleptica: Afraden om een wagen te besturen aan het begin van de behandeling, bij een wijziging van de dosering of bij combinatie met andere middelen.

Opmerkingen:

ICADTS classificatiesysteem:

- Categorie I: geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid.

Risicofactoren	
----------------	--

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing WINAp	Ja	Ja	15-08-2008
Actie Balie	Bij EERSTE UITGIFTE: - Ontraad de patiënt de eerste paar dagen te gaan autorijden. - Informeer de patiënt over de mogelijke bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid. - Geef de folder Verkeersdeelname mee voor praktische adviezen.		
Actie Apotheker	Idem.		

Actie Voorschrijver	BIJ EERSTE UITGIFTE: - Start met de laagste dosering. - Ontraad de patiënt de eerste paar dagen te gaan autorijden. - Informeer de patiënt over de mogelijke bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid.
Actie Ziekenhuis	- Dit geneesmiddel heeft een lichte tot matige invloed op het reactievermogen. - Let op bij ambulante patiënten.