

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, DRUID = Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	Geen gegevens.	Algemeen advies bij anti-epileptica: Autorijden is verboden voor patiënten van wie de ziekte nog niet gestabiliseerd is en moet duidelijk afgeraden worden aan patiënten die zich niet bewust zijn van de effecten van hun ziekte en geneesmiddelen.
ref. 2 DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co-ordination and synthesis report. 2011.	Categorie II: Matige invloed op de rijvaardigheid.	Informatie voor de patiënt: - Adviseer de patiënt de eerste dagen van het gebruik geen auto te rijden en als de dosering toeneemt. Waarschuwingen: - adviseer de patiënt het medicijn in te nemen zoals de arts heeft voorgeschreven - adviseer de patiënt de medicatie niet plotseling te staken en indien hij/zij dat toch het gebruik moeten staken de (behandelend) arts te raadplegen. - Adviseer de patiënt geen alcohol te drinken tijdens de behandeling..
ref. 3 DRUID: Establishment of framework for classification/categorisation and labelling of medicinal drugs and driving annex 9: N03-antiepileptic medicines. 2010.	Bijwerkingen met mogelijke invloed op de rijvaardigheid: Zeer vaak (>10%): duizeligheid, hoofdpijn, diplopie. Vaak (1-10%): evenwichtsstoornis, abnormale coördinatie, verminderd geheugen, verminderd cognitief vermogen, somnolentie, tremor, nystagmus, depressie, vertigo, wazig zien, loopstoornis, asthenie, vermoeidheid.	Informatie voor de patiënt: - adviseer de patiënt het medicijn in te nemen zoals de arts heeft voorgeschreven - adviseer de patiënt de medicatie niet plotseling te staken en indien hij/zij dat toch het gebruik moeten staken de (behandelend) arts te raadplegen. - Adviseer de patiënt geen alcohol te drinken tijdens de behandeling.

ref. 4 SPC Vimpat 13-06-2014.	Lacosamide heeft een geringe tot matige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Behandeling met lacosamide is in verband gebracht met duizeligheid of wazig zien. Derhalve moet patiënten worden afgeraden om te rijden of om mogelijk gevaarlijke machines te bedienen, totdat zij gewend zijn aan de effecten van lacosamide op hun vermogen dergelijke handelingen uit te voeren. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: hoofdpijn, duizeligheid, diplopie (frequentie $\geq 10\%$), depressie, verwardheidstoestand, slapeloosheid, evenwichtsstoornis, abnormale coördinatie, geheugenzwakte, cognitieve stoornis, somnolentie, tremor, nystagmus, aandachtsstoornis, wazig zien, vertigo, tinnitus, loopstoornis, asthenie, vermoeidheid, vallen, dronken gevoel (frequentie 1-10%), agressie, agitatie, euforie gemoedstoestand, psychotische stoornis, zelfmoordpoging, zelfmoordgedachten, hallucinatie (frequentie 0,1-1%).	
---	--	--

Opmerkingen:

DRUID classificatiesysteem:

- Categorie 0: geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie I: weinig invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: matige invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige invloed op de rijvaardigheid.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatiecentrum	Ja	Ja	II	26-11-2014