

Verkeersdeelname: lithium – cat.II

1928

lithiumcarbonaat, lithiumcitraat

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, CBR = Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, ICADTS = International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety.

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 ICADTS: Drug-list. 2007. Summary Report: Categorization system for medicinal drugs affecting driving performance. 2007.	Categorie II: Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een alcoholconcentratie van 0.5-0.8 g/l (0.5-0.8‰).	Geldt voor de normale therapeutische dosering voor volwassenen bij de hoofdindicatie.
ref. 2 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	Depressieve patiënten die gunstig reageren op een lithiumbehandeling, zijn in staat om een wagen te besturen tijdens de behandeling. Het BIVV deelt lithiumzouten in categorie II.1 in.	Categorie II.1 (BIVV): Geneesmiddelen die, op basis van experimentele gegevens, waarschijnlijk een lichte negatieve invloed op de rijvaardigheid kunnen veroorzaken. Algemeen advies bij categorie II: Aanraden om geen wagen te besturen gedurende de eerste dagen of tot patiënt zich bewust is van de effecten van het middel.

Opmerkingen:

ICADTS classificatiesysteem:

- Categorie I: geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid.

Risicofactoren	
----------------	--

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing WINAp	Ja	Ja	28-12-2007

Actie Balie	Bij EERSTE UITGIFTE: – Ontraad de patiënt de eerste week te gaan autorijden. – Informeer de patiënt over de mogelijke bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid. – Geef de folder Verkeersdeelname mee voor praktische adviezen.
Actie Apotheker	Bij EERSTE UITGIFTE: – Adviseer de voorschrijver om met de laagste dosering te starten bij voorkeur in 1 dosis voor de nacht. – Ontraad de patiënt de eerste week te gaan autorijden. – Informeer de patiënt over de mogelijke bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid. – Geef de folder Verkeersdeelname mee voor praktische adviezen.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuis	– Dit geneesmiddel heeft een licht tot matig negatieve invloed op het reactievermogen. – Let op bij ambulante patiënten.