

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, DRUID = Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines,

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	Geen gegevens.	Algemeen advies bij anti-epileptica: Autorijden is verboden voor patiënten van wie de ziekte nog niet gestabiliseerd is en moet duidelijk afgeraden worden aan patiënten die zich niet bewust zijn van de effecten van hun ziekte en geneesmiddelen.
ref. 2 SPC Fycompa 30-09-2014.	Perampanel heeft een matige invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Perampanel kan duizeligheid en somnolentie veroorzaken en kan daarom invloed hebben op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Patiënten worden geadviseerd geen voertuig te besturen, geen complexe machines te bedienen en zich niet bezig te houden met andere mogelijk gevaarlijke activiteiten tot bekend is of perampanel van invloed is op hun vermogen deze taken uit te voeren. Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid: duizeligheid, somnolentie (frequentie $\geq 10\%$), agressie, angst, verwarde toestand, ataxie, evenwichtsstoornis, diplopie, wazig zien, gangstoornis, vermoeidheid, vallen (frequentie 1-10%).	

Opmerkingen:

DRUID classificatiesysteem:

- Categorie 0: geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie I: weinig invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: matige invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige invloed op de rijvaardigheid.

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft perampanel ingedeeld in categorie II op basis van het groepseffect.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatiecentrum	Ja	Ja	II	26-11-2014