

Ulcus pepticum: parasymphathicomimetica

11

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Carbacholum (carbachol) 18-01-94.		<u>Ci</u> : ulcus pepticum.
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Salagen (pilocarpine) 21-04-05.		<u>Ci</u> : Salagen is gecontraïndiceerd bij patiënten met chronische ziekten waarbij gebruik van cholinerge agonisten een risico met zich meebrengt.
ref. 3 Registratiedossier (deel IB) Reminyl (galantamine) 05-10-05.		<u>Waarschuwing</u> : patiënten met een verhoogd risico op het ontstaan van een peptisch ulcus, bijvoorbeeld bij een voorgeschiedenis van ulcusziekte of aanleg voor deze aandoening, moeten worden gevolgd voor symptomen.
ref. 4 Registratiedossier (deel IB) Exelon (rivastigmine) 08-09-06.		<u>Waarschuwing</u> : rivastigmine kan maagzuursecretie verhogen. Voorzichtigheid is geboden bij behandeling van patiënten met actieve maag- of duodenumzweren, of patiënten die gepredisposeerd zijn voor dergelijke aandoeningen.

Opmerkingen:

- Registratiedossiers distigmine, neostigmine, pyridostigmine en pysostigmine geven geen informatie.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	24-06-2004

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 24-06-2004: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in de registratiedossiers van parasymphathicomimetica ulcus als contra-indicatie wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.
-----------	--