

Diabetes mellitus: diazoxide

22

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Proglidem 01-05-09.		<u>Indicaties:</u> Behandeling van leucine gevoelige hypoglykemie, idiopatische hypoglykemie bij kinderen, neoplasie van de eilandjes van Langerhans, bepaalde gevallen van extra-pancreatische neoplasie die verband houdt met hypoglykemie. <u>CI:</u> functionele hypoglykemie. <u>Waarschuwing:</u> ketoacidose of non-ketotische hyperosmolair coma zijn gemeld bij patiënten die behandeld werden met de aanbevolen dosis Proglidem. <u>Bw:</u> Diabetische ketoacidose en hyperosmolaire non-ketotisch coma kan zich snel ontwikkelen. Hyperglykemie of glycosurie kan een verlaging van de dosering vereisen om progressie naar ketoacidose of hyperosmolair coma te vermijden.

Opmerkingen:

- Projectgroep: Het middel werd vroeger gebruikt voor hypertensieve crisis, maar tegenwoordig alleen bij (niet-diabetische) hypoglykemie en als bloedglucoseverhogend middel. Omdat verhoging van de bloedglucoseconcentratie hierbij de indicatie is en geen bijwerking, is een waarschuwing niet nodig.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Nee	10-01-2011