

Epilepsie: doxapram

24

Bron	Bewijs	Effect
IB tekst, Dopram (23-09-05).		Cl: epilepsie en andere convulsieve aandoeningen. Bw: convulsies.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- Vermeld in boek Medicatiebegeleiding (KNMP 1990): “aangezien alle analeptica vanaf een bepaalde dosering convulsief beginnen te werken, wordt algemeen ontraden om dergelijke middelen aan epilepsiepatiënten toe te dienen”.
- Projectgroep: wordt alleen klinisch toegepast.

Risicofactoren	Psychische aandoeningen in de anamnese (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	03-06-2005

Actie Balie	Overleg met de apotheker.
Actie Apotheker	Adviseer de voorschrijver om een zuurstofbehandeling als alternatief voor te schrijven. Indien een alternatief niet mogelijk is: adviseer de voorschrijver om de laagst mogelijke dosis voor te schrijven voor en alert te zijn op het mogelijk optreden van convulsies.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuisapothek	Idem.

Literatuur

- IB tekst, Dopram (22-06-92).