

Epilepsie: contrastmiddelen, jodiumhoudend

Bron	Bewijs	Effect
IB-tekst, Omnipaque (johexol) (30-05-03).		<u>Waarschuwing</u> : bij aanwezig risico op convulsies is voorzichtigheid geboden bij patiënten met epilepsie.
Iomeron (jomeprol) (21-01-05).		<u>Waarschuwing</u> : anticonvulsieve therapie moet voor en tijdens myelografisch onderzoek gehandhaafd blijven bij die patiënten die bekend zijn met convulsies.
Visipaque (jodixanol) (30-08-04).		<u>Waarschuwing</u> : patiënten met epilepsie zijn voorbeschikt voor epileptische aanvallen en vereisen bijzondere aandacht.
Ultravist (jopromide) (14-10-02).		<u>Waarschuwing</u> : intravasaal gebruik: epilepsie in de anamnese kan de kans op convulsieve aanvallen van geïodeerde contrastmiddelen vergroten.
Isovist (Jotrolan) (15-10-04).		<u>Waarschuwing</u> : epilepsie wordt beschouwd als relatieve contra-indicatie voor myelografie.

Opmerkingen:

- IB-teksten: amidotrizoïnezuur, jobitridol, joversol, joxaglinezuur en joxitalaminezuur, geven geen informatie.
- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	05-04-2006

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 05-04-2006: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in de registratiedossiers epilepsie als waarschuwing wordt genoemd, kan dit niet voldoende worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.
-----------	--

Literatuur

- IB-tekst Omnipaque, Iomeron, Visipaque, Ultravist, Isovist.