

Nauwe-kamerhoekglaucoom & primair open-kamerhoekglaucoom: antihistaminica met anticholinerge werking

0042

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Nedeltran (alimemazine) 05-04-93.		<u>Waarschuwing</u> : verhoging van de oogboldruk is mogelijk. Periodiek oogheelkundig onderzoek verdient aanbeveling (bij langdurige behandeling).
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Cinnarizine Reistabletten (cinnarizine) 02-09-03.		<u>Waarschuwing</u> : cinnarizine kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en zo een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.
ref. 3 Registratiedossier (deel IB) Tavegil (clemastine) 02-06-05.		<u>Waarschuwing</u> : antihistaminica dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met o.a. nauwe-kamerhoek-glaucoom.
ref. 4 Registratiedossier (deel IB) Cyclizine PCH 23-11-92 e.a. * ¹		<u>CI</u> : glaucoom, berustend op een nauwe voorste oogkamerhoek.
ref. 5 Registratiedossier (deel IB) Polaramine (dexchlor- feniramine) 03-06-98 e.a.* ²		<u>CI</u> : acuut glaucoom.
ref. 6 Registratiedossier (deel IB) Atarax (hydroxyzine) 04-04-05.		<u>Waarschuwing</u> : Vanwege de anticholinerge werking dient hydroxyzine met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met o.a. glaucoom.
ref. 7 Registratiedossier (deel IB) Toplexil (oxomemazine) 11-07-94.		<u>Waarschuwing</u> : vanwege de anticholinerge eigenschappen dient Toplexil met voorzichtigheid te worden toegepast bij patiënten met nauwe kamerhoek glaucoom want door pupilverwijding kan de oogdruk toenemen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaakt worden.
ref. 8 Registratiedossier (deel IB) Promethazine PCH 23-06-98.		<u>Waarschuwing</u> : voorzichtigheid is geboden bij patiënten met glaucoom.

*¹ Periactin (cyproheptadine) 09-01-02.

*² Fenistil (dimetindeen) 30-05-02.

Opmerkingen^[JR1]:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed) betreffende nauwe-kamerhoekglaucoom.
- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed) betreffende primair open-kamerhoekglaucoom.
- Registratiedossiers (deel IB) Zyrtec (cetirizine) 04-04-05, Primatour (chloorcyclizine/cinnarizine) 02-03-01, Zaditen (ketotifen) 05-10-05, Mebhydroline PCH 17-03-81 en Suprimal (meclozine) 19-03-90 geven geen informatie.
- In theorie zou vanwege de anticholinerge werking mydriasis (pupilverwijding) kunnen optreden, wat tot een acute nauwehoekglaucoom kan leiden.
- Bij glaucoom dient onderscheid gemaakt te worden in open-kamerhoekglaucoom en nauwe-kamerhoekglaucoom. Bij open-kamerhoekglaucoom wordt een verhoging van de oogdruk veroorzaakt door een belemmering van de afvoer van kamerwater ter hoogte van het trabekelsysteem en bij nauwe-kamerhoekglaucoom door afsluiting van de oogkamerhoek.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

Nauwe-kamerhoekglaucoom:

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	13-09-2006

Primair open-kamerhoekglaucoom:

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	13-09-2006

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 13-09-2006: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in de verschillende registratiedossiers glaucoom als contra-indicatie of waarschuwing wordt genoemd, kan dit niet onderbouwd worden met de beschikbare literatuur voor zowel nauwe-kamerhoekglaucoom als primair open-kamerhoekglaucoom.
-----------	---