

Nauwe-kamerhoekglaucoom & primair open-kamerhoekglaucoom: amfetaminen

0053

IOP: intraocular pressure; oogdruk.

NKG: nauwehoekglaucoom.

POAG: primary open angle glaucoma.

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Bartlik B. Use of methylphenidate in a patient with glaucoma and attention-deficit hyperactivity disorder: a clinical dilemma. Arch Gen Psychiatry 1997;54:188-9.	casus n=1	Bij patiënten met glaucoom (die onder controle is), kunnen psychofarmaca worden voorgeschreven indien de IOP vóór en tijdens de therapie regelmatig wordt bepaald. Patiënt (55 jaar) krijgt ondanks POAG toch methylfenidaat (25 mg/dag) voorgeschreven. Tijdens het gebruik van methylfenidaat (gedurende 1 jaar) treedt geen stijging van de oogdruk (IOP) op.
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Ritalin (methylfenidaat) 13-09-05 e.a. * ¹		<u>CI</u> : glaucoom.

*¹ Concerta (methylfenidaat) 03-05-05.

Opmerkingen^[JR1]:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed) betreffende nauwe-kamerhoekglaucoom.
- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed) betreffende primair open-kamerhoekglaucoom.
- Bij glaucoom dient onderscheid gemaakt te worden in open-kamerhoekglaucoom en nauwe-kamerhoekglaucoom. Bij open-kamerhoekglaucoom wordt een verhoging van de oogdruk veroorzaakt door een belemmering van de afvoer van kamerwater ter hoogte van het trabekelsysteem en bij nauwe-kamerhoekglaucoom door afsluiting van de oogkamerhoek.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

Nauwe-kamerhoekglaucoom:

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	13-09-2006

Primair open-kamerhoekglaucoom:

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	13-09-2006

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 13-09-2006: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in het registratiedossier glaucoom als contra-indicatie wordt genoemd, kan dit niet onderbouwd worden met de beschikbare literatuur voor zowel nauwe-kamerhoekglaucoom als primair open-kamerhoekglaucoom. Literatuur: • Bartlik B. Use of methylphenidate in a patient with glaucoma and attention-deficit hyperactivity disorder: a clinical dilemma. Arch Gen Psychiatry 1997;54:188-9. • Registratiedossier (deel IB) Ritalin.
-----------	---