

Astma/ COPD: carboprost, dinoproston, sulproston

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Prostin/15M (carboprost) 30-10-03.		<u>Cl</u> : patiënten met bekende actieve longaandoeningen. <u>Bw</u> : bronchiale spasmen bij gepredisponeerde patiënten.
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Prostin E2 (dinoproston) 24-09-04.		<u>Waarschuwing</u> : voorzichtigheid is geboden bij astma of astma in de anamnese. <u>Bw</u> : < 0,01%: bronchospasmen, astma.
ref. 3 Registratiedossier (deel IB) Nalador-500 (sulproston) 18-07-03.		<u>Cl</u> : sulproston mag niet gebruikt worden bij astma. <u>Bw</u> : bronchiale spasmen bij gepredisponeerde patiënten.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- Vermeld in boek medicatiebegeleiding (KNMP 1990): "Prostaglandines bezitten bronchoconstrictieve eigenschappen. Dinoproston heeft vooral een bronchusverwijdende werking, maar kan bij sommige mensen ook bronchoconstrictie veroorzaken".
- NVOG richtlijnen 1997 (nr. 5) (www.nvog.nl): astma/ COPD is een relatieve contra-indicatie bij sulproston.

Datum literatuursearch: 04-05-2010.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	28-04-2004