



Hartfalen: disulfiram

80

CONCLUSIE

Werkgroep KNMP/SHB 15-11-2017: toepassen van disulfiram is het risico op de ernstige reactie (ritmestoornissen) op het middel niet waard.

Werkgroep KNMP 10-01-2011: er is weinig onderbouwing, maar de gevonden casus wijst wel op een toegenomen risico voor een fatale afloop. Vanwege de ernst van het risico besluit de projectgroep toch tot een ja/ja-bewaking.

PICO

P(atient)	patiënten met hartfalen
I(ntervention)	disulfiram
C(omparison / Control)	placebo / geen disulfiram
O(utcome)	risico op verergering hartfalen

Datum literatuursearch: 30-08-2017

PUBMED

Zoekterm:

disulfiram AND heart failure

Bron	Bewijs	Resultaten/opmerkingen

OVERIGE

Bron	Effect
ref. 1 Chick J et al. Safety issues concerning the use of disulfiram in treating alcohol dependence. Drug Saf 1999;20:427-35.	Een patiënt die 5 g disulfiram gebruikte in 4 dagen en 15 g alcohol innam, kreeg een collaps. Na bijkomen met therapie overleed hij 4 uur later aan acuut hartfalen. Zijn ECG voor dit incident toonde geen afwijkingen. Door het risico van fatale afloop van deze combinatie wordt afgeraden om patiënten met hartproblemen te behandelen met disulfiram. De contra-indicatie is absoluut als het gaat om patiënten met een hoog risico op alcoholinname tijdens behandeling met disulfiram.
ref. 2 SPC Antabus (disulfiram) 13-07-15.	<u>CI</u> : hart-insufficiëntie

AANVULLENDE OPMERKINGEN

•

RISICOFACTOREN

Risicofactoren	Belaste familieanamnese voor cardiovasculaire aandoeningen, roken, overmatig alcoholgebruik, hyperlipidemie, hypertensie, diabetes (NHG-Standaard Hartfalen 2010).
----------------	--

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	15-11-2017